

3M™ Prevena™ Therapy

De kracht om te beschermen

De standaardzorg voor
hartchirurgie verder verbeteren
buiten de operatiekamer





Patiëntenzorg na hartchirurgie reikt verder dan de operatiekamer.

In een steeds complexere gezondheidszorg worden chirurgen geconfronteerd met een unieke combinatie van uitdagingen die de resultaten negatief kunnen beïnvloeden. Uitdagingen zoals complexe of uitgestelde operaties, minder personeel voor postoperatieve zorg en toenemende comorbiditeit van patiënten kunnen bijdragen aan postoperatieve complicaties die de genezing verstoren en zorgen voor een langer verblijf in het ziekenhuis.

Postoperatieve complicaties beheersen.

In de complexe zorgomgeving van vandaag is het voorkomen van een opeenstapeling van postoperatieve complicaties een prioriteit en artsen kiezen steeds vaker voor oplossingen die minder tijdrovend zijn en die een gunstige uitwerking hebben op::

- Efficiëntie en kosteneffectiviteit
- Minimalisering van het ziekenhuisverblijf
- Minimalisering van complicaties
- Minder heropnames
- Mobiliteit van zorg
- Herstel thuis
- Zorgconsulten op afstand

Risico's van hartchirurgie herkennen

Open hart-chirurgie met mediane sternotomie-toegang kan soms leiden tot ernstige complicaties, waaronder sternale wond-infecties (SWI's). SWI's zijn een zeldzame en levensbedreigende complicatie die vooral bij patiënten die een cardiothoracale operatie ondergaan, lastig te behandelen is. De grootste zorg bij SWI's is het risico dat het zich ontwikkelt tot diepe sternale wond-infecties (DSWI's); Dit kan leiden tot mediastinitis, wat gepaard gaat met een hoog risico op sterfte en kosten.



Diepe sternale wond-infecties worden geassocieerd met een sterftcijfer tot 50%¹



Gemiddelde toename van het ziekenhuisverblijf vanwege SSI na hartchirurgie²



Aanvullende gemiddelde kosten vanwege SSI na hartchirurgie^{2*}

*Berekend als gemiddelde extra kosten voor de behandeling van patiënten met een SSI van €36.261 ten opzichte van de gemiddelde kosten voor de behandeling van patiënten zonder een SSI van €13.356,10 3M™ Prevena™-verbanden en 3M™ Prevena Restor™-verbanden kunnen worden toegepast bij verschillende procedures en anatomische locaties.



Vergroot uw controle op postoperatieve wondgenezing.

3M™ Prevena™ Therapy is ontworpen voor de behandeling van gesloten incisies, om het risico op postoperatieve complicaties, zoals infectie, te helpen verlagen. Helpt de incisieplaats tot 7 of 14 dagen* na de operatie te beschermen, waardoor u meer controle hebt op de postoperatieve genezing, met name bij patiënten met verhoogd risico op complicaties.

Prevena Therapy biedt chirurgen de zekerheid dat hun patiënten beter worden beschermd, ook buiten de operatiekamer.



Werkt als een
barrière tegen
externe contaminatie.



Vermindert de laterale
spanning bij gehechte/
geniete incisies.³



Levert continu
-125 mmHg tot
7 of 14 dagen lang*



Verwijdert vloeistoffen
en infectieus materiaal.**



Helpt incisie-randen
bij elkaar te houden.




Vermindert oedeem.

*De maximale duur van de therapie met het 3M™ Prevena™ Therapy-platform bedraagt 7 dagen. De maximale duur van de behandeling bij het 3M™ Prevena Restor™ Therapy-platform bedraagt 14 dagen.
**In een opvangbeker.

3M™ Prevena™ Verband en 3M™ Prevena Restor™ Verband kunnen worden gebruikt bij diverse procedures en op diverse anatomische locaties.

De wetenschap achter 3M™ Prevena™ en 3M™ Prevena Restor™ Therapy.

Prevena Therapy maakt gebruik van continue negatieve druktherapie van -125 mmHg, verbandtechnologie met netvormig open-celfoam (ROCF) en geoptimaliseerd exsudaatmanagement (vervangbare opvangbeker) over gesloten incisies om de genezing te bevorderen.



Ontworpen om de postoperatieve zorg te optimaliseren:

- Vormgeving maakt een gelijkmatige verdeling van de negatieve druk mogelijk
- Zelfklevende folie vormt een barrière tegen micro-organismen van buitenaf
- Verbeterd vloeistofbeheer*
- Buigt mee om beweging mogelijk te maken
- Bevat 0,019% ionisch zilver om bacteriële kolonisatie in de stof te verminderen

Prevena Therapy

- Appositionele kracht
- Weefseldecompressie
- Richting van de vloeistof

Hoe Prevena Therapy kan helpen om postoperatief oedeem te verminderen.

De effecten van toepassing van negatieve druktherapie op intacte huid werden geëvalueerd door middel van Finite Element Analysis (FEA).⁴

Op basis van de analyse wordt verondersteld dat negatieve druktherapie op intacte huid volumetrische expansie biedt die kan helpen:


- Het weefsel onder het verband uit te rekken en het weefsel open te trekken
- Lokale interstitiële vloeistofdruk te verlagen
- Open lymfevaten om vloeistofafvoer mogelijk te maken

Met oedeem

Gesloten terminale lymfeporie (overlappende endotheelcellen)

Zonder oedeem

Open terminale lymfeporie (gescheiden endotheelcellen)




*In een opvangbeker.


Steeds meer klinisch bewijs dat het gebruik van 3M™ Prevena™ Therapy ondersteunt.

Een systematische review en meta-analyse van zeven onderzoeken naar chirurgische hartprocedures toonde aan dat 3M™ Prevena™ Therapy een significante vermindering van het risico op infecties van de operatiewond vertoonde (POWI's).⁵


Verminderd risico op klinische complicaties:




Alle SWI's
5,6% Prevena therapie versus 15,5% standaardverband (p=0,0001)*



Diepe SWI's
1,8% Prevena therapie versus 4,0% standaardverband (p=0,0001)*



Oppervlakkige SWI's
3,7% Prevena therapie versus 11,4% standaardverband (p=0,0001)*



Heropnames IC
0,4% Prevena therapie versus 2,1% standaardverband (p=0,0001)*

Voor toegang tot meer peer-reviewed klinisch bewijsmateriaal kunt u de onderstaande QR-code scannen en een exemplaar van ons compendium met klinisch bewijsmateriaal aanvragen.



Wetenschappelijk onderbouwd. Vertrouwd door velen.

Prevena Therapy wordt door veel artsen over de hele wereld gebruikt en vertrouwd om gesloten incisies bij risicopatiënten en -procedures te helpen beheren.




200+
peer-reviewed klinische artikelen**



30+
gerandomiseerde gecontroleerde trials**



Vanuit het ziekenhuis



Naar huis

*Statistische significantie (p < 0,05).

Berekeningen zijn gebaseerd op de in deze studie gemelde relatieve incidentie van patiëntengroepen.

**Status per november 2022.

Een nieuwe kijk op incisiebeheer.

Werkt als een barrière

Ontworpen om infecties te voorkomen en zo chirurgische complicaties te helpen verminderen.

Precisie ontwerp

Verband sluit naadloos aan bij de patiënt voor een gelijkmatige verdeling van negatieve druk en bewegelijkheid van de patiënt.

Eenvoudig te gebruiken

Ruim assortiment van Peel & Place verbanden, en zelfs een customizable variant.


Waterbestendig

Zie de gebruiksaanwijzingen voor de aanvullende details

3M™ Prevena™-verband

Incisie oppervlakte

Prevena Peel and Place verband helpt de omgeving van gesloten chirurgische incisies te beschermen en beheren en voert vocht weg van de chirurgische incisie door de toepassing van continue negatieve druk.



Lineaire dekking

Ontworpen voor het beheren van lineaire, kruisende en meervoudige incisies

Voorgevormde ontwerpen voor peel-and-place aanbrengen



3M™ Prevena™ Peel & Place verband – 13 cm



3M™ Prevena™ Peel & Place verband – 20 cm



3M™ Prevena™ Plus Peel & Place verband – 35 cm

Ontworpen voor flexibiliteit en aanpassing door de gebruiker




3M™ Prevena™ Customizable Dressing

3M™ Prevena Restor™ verband

Incisie oppervlakte

Prevena Restor Verband biedt uitgebreide bescherming voor diverse anatomische locaties. In combinatie met negatieve druk bieden de verbanden stabilisatie en helpen ze de plaats van operatie en het omliggende zachte weefsel te beschermen tegen complicaties en zwelling.



Grotere oppervlakte dekking

Ontworpen om de dekking uit te breiden en de plaats van operatie en het omringende zachte weefsel te beschermen.



3M™ Prevena Restor™ Bella•Form™ Verband



Te gebruiken met Solventum-systemen voor wondtherapie met negatieve druk.



3M™ Prevena™ Plus 125 Therapieunit

Therapieunit voor wondtherapie met negatieve druk voor eenmalig gebruik, compatibel met alle 3M™ Prevena™ verbanden.

Kenmerken:

- Vooraf ingestelde, continue wondtherapie met negatieve druk van -125 mmHg gedurende 7 of 14 dagen*
- Wegwerpartikel voor gebruik bij één patiënt
- Oplaadbare batterij

Specificaties:

- Afmetingen: Ongeveer 8,9 x 16,3 x 5,49 cm
- Gewicht met lege opvangbeker: 0,29 kg

Prevena-verbanden zijn ook compatibel met Traditionele systemen voor negatieve-druktherapie van Solventum: 3M™ V.A.C.® Ulta Therapieunit, 3M™ ActiV.A.C.® Therapieunit



Bestelinformatie

Artikelcode	Beschrijving	Eenheid
Therapie- systemen		
PRE4010	3M™ Prevena™ Plus 125 Therapy Unit – 14 dagen	per stuk
Verbanden		
PRE1155	3M™ Prevena™ Peel & Place verband – 13 cm	Verpakking van 5
PRE1055	3M™ Prevena™ Peel & Place verband – 20 cm	Verpakking van 5
PRE3255	3M™ Prevena™ Plus Peel & Place verband – 35 cm	Verpakking van 5
PRE4055	3M™ Prevena™ Plus Customizable Dressing	Verpakking van 5
PRE5255	3M™ Prevena Restor™ Bella•Form™ verband – 21 cm x 19 cm	Verpakking van 5
PRE5355	3M™ Prevena Restor™ Bella•Form™ verband – 24 cm x 22 cm	Verpakking van 5
PRE5455	3M™ Prevena Restor™ Bella•Form™ verband – 29 cm x 27 cm	Verpakking van 5
Accessoires		
PRE1095	3M™ Prevena™ 45 ml-opvangbeker	Verpakking van 5
PRE4095	3M™ Prevena™ Plus 150 ml-opvangbeker	Verpakking van 5
PRE9090	3M™ Prevena™ Therapy V.A.C.® Connector	Verpakking van 10
Kits		
PRE1001	3M™ Prevena™ Incisiemanagementsysteem – 20 cm	per stuk
PRE1101	3M™ Prevena™ Incisiemanagementsysteem – 13 cm	per stuk
PRE3201	3M™ Prevena™ Plus Incisiemanagementsysteem – 35 cm	per stuk
PRE4001	3M™ Prevena™ Plus Customizable Incisiemanagementsysteem	per stuk
PRE1121	3M™ Prevena™ Duo Incisiemanagementsysteem – 13 cm/13 cm	per stuk
PRE5221	3M™ Prevena Restor™ Bella•Form™ Incisiemanagementsysteem – 21 cm x 19 cm	per stuk
PRE5321	3M™ Prevena Restor™ Bella•Form™ Incisiemanagementsysteem – 24 cm x 24 cm	per stuk
PRE5421	3M™ Prevena Restor™ Bella•Form™ Incisiemanagementsysteem – 29 cm x 27 cm	per stuk

*De maximale duur van de therapie met het 3M™ Prevena™ Therapy-portfolio bedraagt 7 dagen. De maximale duur van de behandeling bij het 3M™ Prevena Restor™ Therapy-portfolio bedraagt 14 dagen.

Meer informatie op Prevena Central.



Prevena Central is een platform waar u alles kunt vinden over 3M™ Prevena™ Therapy. Prevena Central is speciaal opgezet voor zorgverleners en biedt informatie over incisie management om de zorgstandaard naar een hoger plan te tillen.



Opmerking: voor deze producten en therapieën bestaan specifieke indicaties, beperkingen, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een arts en de productinstructies voor gebruik. Dit materiaal is bedoeld voor zorgprofessionals.

Referenties:

1. Willy C, Engelhardt M, et al. The impact of surgical site occurrences and the role of closed incision negative pressure therapy. International Wound Journal. 2016, Pages 35–46.
2. Graf K, Ott E, Vonberg RP, et al. Surgical site infections e economic consequences for the health care system [Review] Langenbecks Archs Surg 2011;396:453e9.
3. Wilkes RP, Kilpadi DV, Zhao Y, et al. Closed incision management with negative pressure wound therapy (CIM): Biomechanics. Surg Innov. 2012;19(1):67–75.
4. Haridas B, Kieswetter K, Haggerty M. Test Report: Negative Pressure Therapy on Intact Skin: Poroelastic Finite Element Modeling of Interstitial Fluid Pressures. DOC- 0000049240 Rev A, 1-13. 6-27-2019. San Antonio, TX, KCl. Ref Type: Report.
5. Loubani M, Cooper M, Silverman R, Bongards C, Griffin L. Surgical site infection outcomes of two different closed incision negative pressure therapy systems in cardiac surgery: Systematic review and meta-analysis. Int Wound J. 2024;21(1):e14599.

Distributed by:



GD Medical
Hastelweg 224
5652 CL Eindhoven
Tel +31(0)40 3031 099
customerservice@gdmedical.nl
www.gdmedical.nl

GD Medical Belgium
B.V Rue Abbé Cuypers 3
1040 Brussel
Tel +32 (0) 2 808 58 80
customerservice@gdmedical.be
www.gdmedical.be

© Solventum 2025. Alle rechten voorbehouden. Solventum en het S-logo zijn handelsmerken van Solventum of diens dochterondernemingen. 3M en het logo van 3M zijn handelsmerken van 3M. Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. EMEA-70-2013-1605-9. OMG1485968,